

# Tema 1: Espacios vectoriales

$$\sqrt{\pi}$$

Curso 2009-2010

- Consideramos que  $E$  es un espacio vectorial (e.v.) en el cuerpo  $K$  de los escalares, definido:

■  $(E, +, \cdot)$  con las siguientes propiedades:

- $(+)$ : asociativa, conmutativa, tiene elemento cero  $\vec{0}$  y elemento inverso  $(-u)$ .
- $(\cdot)$  i.  $a(u + v) = au + av$  ii.  $(a + b)u = au + bu$  iii.  $(ab)u = a(bu)$  iv.  $1u = u$

-**Subespacio vectorial:**  $F \subset E$  es subespacio si:

1.  $u, v \in F \Rightarrow u + v \in F$ .
2.  $u \in F, \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in F$

- **Combinaciones lineales:** Decimos que  $u$  es combinación lineal de  $v_1, \dots, v_n$  si  $\exists a^1, \dots, a^n$  tal que

$$u = \sum_{i=1}^n a^i v_i. \text{ Además, toda combinación lineal de vectores de } F \text{ es un vector de } F$$

-  $\langle S \rangle$  es el conjunto de las combinaciones lineales de  $S$  y, además, es el más pequeño de los subespacios vectoriales que contienen a  $S$ , de manera que si  $\langle S \rangle = F$  diremos que  $F$  está generado por  $S$  y que  $S$  es un sistema de generadores.

-**Base  $B$  de un e.v.:**  $B \subset E \Leftrightarrow$ :

1.  $\forall u \in E$  es linealmente independiente:  $u = \sum_{i=1}^n a^i v_i \Rightarrow a^i = 0; i = 1, \dots, n$
2.  $\langle B \rangle$  es un sistema de generadores

- Todo  $E \neq \{\vec{0}\}$  generado por un número finito de vectores tiene una base finita  $\Rightarrow$  Todo sistema de generadores contiene una base  $\Rightarrow$  Toda base es un sistema de generadores.

-**Teorema de Steinitz:** Sean  $u_1, \dots, u_n$  una base de  $E$  y  $v_1, \dots, v_m$  vectores independientes cualesquiera, podemos sustituir  $m$  vectores de la base por  $v_1, \dots, v_m$  obteniendo una nueva base.

- Si  $E$  tiene una base finita, entonces, todas las bases tienen el mismo número de vectores. Dicho número coincide con la dimensión de  $E$ , es además el número máximo de vectores linealmente independientes y el número mínimo de generadores.

- Sea  $F \subset E$ , se tiene que  $\dim F \leq \dim E$  y  $\dim F = \dim E \Leftrightarrow F = E$ .

-  $F \cap G$  es un subespacio vectorial de  $E$ . La unión de  $F$  y  $G$ , podemos definirla como:  $F \cup G \approx F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}$  y es el más pequeño de los subespacios que contienen  $F$  y  $G$ .

- **Fórmula de Grassman:** Sean  $F \subset E$  y  $G \subset E$ , entonces  $\dim F + \dim G = \dim(F + G) + \dim(F \cap G)$ .

- Si  $(F \cap G) = \{\vec{0}\} \Rightarrow \dim F + \dim G = \dim(F + G)$ , es decir, es suma directa si la expresión de un vector como suma de uno de  $F$  y uno de  $G$  es única. Además, si  $\dim E$  es finita, se tiene que:  $E = F \oplus G$ .

-**Coordenadas:** Sea  $v = \sum_{i=0}^n a^i u_i \implies a^i$  son las coordenadas de  $v$  en la base  $u_i$

**CAMBIO DE BASE** Un mismo vector  $v$  podemos expresarlo de maneras diferentes si variamos la base; por ejemplo:

1.  $v = \sum_{i=0}^n a^i u_i$ , donde  $a^i$  son las coordenadas de  $v$  en la primera base,  $u_i$ .

2.  $v = \sum_{j=0}^n b^j e_j$ , donde  $b^j$  son las coordenadas de  $v$  en la segunda base,  $e_j$ . Tenemos que  $i = j = 1, \dots, n$ .

Entonces, estableceremos una relación entre  $a^i$  y  $b^j$ :

a) Los vectores que forman la segunda base, podemos expresarlos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} e_1 &= p_1^1 u_1 + \dots + p_1^n u_n = \sum_{i=1}^n p_1^i u_i \\ &\vdots \\ e_n &= p_n^1 u_1 + \dots + p_n^n u_n = \sum_{i=1}^n p_n^i u_i \end{aligned}$$

Con lo cual, generalizando, tenemos que  $e_j = \sum_{i=1}^n p_j^i u_i \quad j = 1, \dots, n$ .

b) Entonces, podemos expresar un vector  $v$  de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} v &= \sum_{j=1}^n b^j e_j = \sum_{j=1}^n b^j \left( \sum_{i=1}^n p_j^i u_i \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (b^j p_j^i u_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (b^j p_j^i u_i) = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n b^j p_j^i \right) u_i = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n p_j^i b^j \right) u_i = \sum_{i=1}^n a^i u_i. \end{aligned}$$

Con lo cual:

$$a^i = \sum_{j=1}^n p_j^i b^j$$

Donde:  $a^i \equiv A = \begin{pmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^n \end{pmatrix}$  y  $b^j \equiv B = \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}$

Las  $a^i$  son las coordenadas del vector en la primera base  $u_1, \dots, u_n$  y las  $b^j$  son las coordenadas del vector en la segunda base  $e_1, \dots, e_n$ . Y finalmente:

$$p_j^i \equiv P = \begin{pmatrix} p_1^1 & \dots & p_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ p_1^n & \dots & p_n^n \end{pmatrix},$$

que es la matriz del cambio de base de la primera base  $u_i$  a la segunda base  $e_i$ . Cada columna, representan las coordenadas de la segunda base en la primera, es decir las coordenadas de  $e_1, \dots, e_n$  en la base  $u_1$ .

Tenemos que:  $A = P \cdot B \Rightarrow B = Q \cdot A$ , donde  $Q = P^{-1}$ , con lo cual  $Q \cdot P = I$ .